



【AGA・ED】

デュタステリド錠 0.5mg

用量・用法	1日1回1錠を服用
主な副作用	リビドー（性欲）減退、勃起不全、射精障害など
重大な副作用	肝機能障害、黄疸など

添付文書：https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00070_172.pdf

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=51563>

シルデナフィル錠 50mg

用量・用法	1日1回0.5～1錠を性行為の約1時間前に服用
主な副作用	血管拡張（ほてり、潮紅）、頭痛、消化不良、動悸など
重大な副作用	

添付文書：https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00063_100.pdf

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=39537>

バルデナフィル錠 20mg

用量・用法	1日1回0.5～1錠を性行為の約1時間前に服用
主な副作用	ほてり、動悸、頭痛、めまい、鼻閉、消化不良など
重大な副作用	

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00068797.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=47864>

タダラフィル錠 20mg

用量・用法	1日1回0.5～1錠を性行為の約1時間前に服用
主な副作用	頭痛、潮紅、ほてり、消化不良、背部痛、筋痛、鼻閉、四肢痛など
重大な副作用	過敏症など

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00070227.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=50184>