



【ピル・アフターピル】

レボノルゲストレル錠 1.5mg

用量・用法	1 回 1 錠を性交後 72 時間以内にできるだけ速やかに服用
主な副作用	吐き気、頭痛、下腹部痛、眠気、不正子宮出血など
重大な副作用	

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00067924.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=46170>

ファボワール錠 28

用量・用法	1 日 1 回 1 錠を月経の第 1 日目から毎日一定の時刻に服用
主な副作用	吐き気・嘔吐、乳房痛、頭痛、不正性器出血、倦怠感、下痢、腹痛、発疹、浮腫、黄疸など
重大な副作用	血栓症など

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00059740.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=18827>

ドロエチ配合錠

用量・用法	1 日 1 回 1 錠を月経の第 1 日目から毎日一定の時刻に服用
主な副作用	不正子宮出血、吐き気、頭痛など
重大な副作用	血栓症など

添付文書：https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/0007020_1.pdf

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=50370>

スリンド錠 28

用量・用法	1 日 1 回 1 錠を月経の第 1 日目から毎日一定の時刻に服用
主な副作用	不正性器出血、頭痛、月経異常、下腹部痛、腹痛、下痢、吐き気、ざ瘡、乳房不快感など
重大な副作用	

添付文書：https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/0007_1700.pdf

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=52601>