



【メディカルスキンケア】

シナール配合錠

用量・用法	1日1～3回1～3錠を服用
主な副作用	胃不快感、吐き気、嘔吐、下痢など
重大な副作用	

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00057121.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=16929>

ユベラ錠 50mg

用量・用法	1日2～3回1～2錠を服用
主な副作用	便秘、胃部不快感、下痢、発疹など
重大な副作用	

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00069485.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=9679>

トランサミン錠 500mg

用量・用法	1日3～4回0.5～1錠を服用
主な副作用	食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、胸やけなど
重大な副作用	痙攣など

添付文書：<https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00055355.pdf>

くすりのしおり：<https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=10780>

【未承認薬について】

・未承認医薬品等

「シナール」、「ユベラ」、「トランサミン」は、国内承認薬ですが、スキンケア目的では承認されていません。

・入手経路等

当院では国内承認薬は国内の医薬品卸会社より購入しています。

・国内の承認医薬品の有無

スキンケア目的で承認されている薬はありません。

・諸外国における安全性などに係る情報

諸外国において、治療に伴う重大な副作用の報告はありません。

・医薬品副作用被害救済制度について

万が一重篤な副作用が出た場合、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。